astringente. En las Sierras de Alcaraz y Segura se ha usado para paliar dolores renales, la dismenorrea, afecciones hepáticas y calenturas. También es usada en jardinería.

Asplenium fontanum (L.) Bernh., in J. Bot. (Schrader) 1799(1): 314 (1799)

Polypodium fontanum L. Sp. Pl.: 1089 (1753) [basión.]

Asplenium leptophyllum Lag., D. García & Clemente in Anales Ci. Nat. 5(14) : 155, tab. 141 fig. 3 (1802)

Familia: ASPLENIACEAE

Nombres comunes: Desconocidos.

Descripción (Figura 14): Rizoma**:** robusto, vertical, cubierto de páleas lanceoladas, castañas. Frondes**:** en haces densos, hasta 30 cm. Pecíolo**:** castaño en la base y verde en el resto, más corto que la lámina. Lámina**:** verde clara, 2-3 veces pinnada, longitud al menos 5 veces su anchura, generalmente lanceolada, con el haz brillante. Raquis glabro aunque puede presentar pelos glandulosos. Pinnas**:** oblongas, con 3-8 pares de pínnulas. Con frecuencia se incurvan hacia el envés. Venas**:** abiertas. Soros**:** oblongos, dispuestos próximos al nervio medio. Indusio entero o lobulado. Esporas**:** de 35 a 40 µm de diámetro. Perisporio equinulado-reticulado. Esporulación**:** de marzo a noviembre.

Ecología y biotipo: Paredes y grietas de rocas calcáreas, sin requerir excesiva humedad. 0-1800 m. Hemicriptófito.

Corología: Mediterráneo occidental y norte de África. En la Península Ibérica tiene su mayor representación en las zonas calizas de Pirineos y la mitad oriental. En la provincia de Albacete lo encontramos en las zonas próximas al río Júcar (Casas de Ves, Villa de Ves, presa El Molinar) **(Figura 13).**

Usos: Empleado en jardinería

Notas: Puede ser confundido con *Asplenium foreziense.*

Asplenium onopteris L., Sp. Pl.: 1081 (1753)

Asplenium virgilii Bory, Exp. Sci. Morée, Bot: 298 (1832)

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *onopteris* (L.) Heufler in Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien 6: 310 (1856)

Asplenium adiantum-nigrum auct.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»