

Género y especie	WH 44	WH 45	WH 46	WH 55	WH 56	WH 58	WH 65	XII 16
Subfamilia Acontiinae								
<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Melipotis arcuinna</i> (Hübner, 1790)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Porphyrynia polygramma</i> (Duponchel, 1836)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Porphyrynia cochyliformis</i> (Guenée, 1852)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Porphyrynia ostrina</i> (Hübner, 1808)	+	+	+	+	+	+	+	+
n.º de spp. por cuadrícula	1	—	—	2	5	—	—	
Número total de especies: 6.								
Subfamilia Acronictinae								
<i>Acronicta aceris</i> (L., 1758)	+	+	+	+	+	+	+	(1)
<i>Acronicta megacephala</i> (D. & Schiff., 1775)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Acronicta psi</i> (L., 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Acronicta rumicis</i> (L., 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Acronicta tridens</i> (D. & Schiff., 1775)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cryphia ravula</i> (Hübner, 1809)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Raphia hybris</i> (Hübner, 1813)	+	+	+	+	+	+	+	+
n.º de spp. por cuadrícula	1	1	2	3	5	—	2	
Número total de especies: 8.								
Subfamilia Amphipyrae								
<i>Apamea alpigena</i> (Boisduval, 1832)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Apamea arabs</i> (Oberthür, 1881)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Auchmis detorsa</i> (Esper, 1791)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Caradrina bermeja</i> (Ribbe, 1912)	+	+	+	+	+	+	+	(2)
<i>Caradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Caradrina flavirena</i> (Guenée, 1852)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Caradrina noctivaga</i> (Bellier, 1863)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Caradrina proxima</i> (Rambur, 1839)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Chloantha hyperici</i> (D. & Schiff., 1775)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Cosmia diffinis</i> (L., 1767)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hoplodrina ambigua</i> (D. & Schiff., 1775)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Laphygma ciliatum</i> (Guenée, 1852)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Laphygma exigua</i> (Hübner, 1808)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Mormo maura</i> (L., 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Phlogophora meticulosa</i> (L., 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Phodetes pygmaea</i> (Haworth, 1809)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Polyphaenis xanthochloris</i> (Boisd., 1840)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Prodemia littoralis</i> (Boisd., 1833)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Rhizedra lutea</i> (Hübner, 1803)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefebvre, 1827)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Thalophila vitalba</i> (Freyer, 1834)	+	+	+	+	+	+	+	+
n.º de spp. por cuadrícula	1	5	7	6	19	1	1	
Número total de especies: 22								