

Horna

10-12-88. Cola de Caballo. Pared rocosa. Adulto.

La Gila

24-5-92. Ejemplar adulto debajo de una gran piedra.

Las Mariquillas

28-9-87. En las rocas de una rambla. Adulto.

<u>MES</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
Enero	1
Febrero	1
Marzo	—
Abril	—
Mayo	2
Junio	—
Julio	—
Agosto	—
Septiembre	4
Octubre	—
Noviembre	1
Diciembre	1

4. SALAMANQUESA ROSADA *Hemidactylus turcicus*

Es esta una salamanguesa delicada, de piel casi transparente. Se diferencia de ejemplares jóvenes de la salamanguesa común por poseer dos series de laminillas adhesivas en los dedos; además, el extremo terminal de todos los dedos está libre de laminillas y provisto de uñas. Es un saurio muy termófilo y se distribuye por las regiones costeras mediterráneas de la Península, adentrándose hacia el interior por el valle del Ebro y Andalucía (Martínez Rica, 1974). Está presente en las provincias de Alicante (Escarré y Vericad, 1983), Murcia (Salvador, 1982) y Granada (Pleguezuelos, 1989). Recientemente ha sido citada por Manzanares (1987) en las comarcas de Tobarra y Hellín, las más áridas de nuestra provincia.

Familia LACERTIDAE

5. LAGARTIJA COLIRROJA *Acanthodactylus erithrurus*

Lagartija con escamas lisas, sin escama occipital. Adultos parduzco-grisáceos con listas blancas más o menos continuas. Punteado negro presente. Los jóvenes y subadultos tienen la cola roja. Además, los juveniles presentan un