




Figura 2.- Área de estudio: provincia de Albacete, Castilla-La Mancha (SE de España). Localización de las citas de pagaza piconegra del periodo 1988-2021. A: complejo lagunar de Pétrola, Corral-Rubio y La Higuera, en el Corredor de Almansa. B: alrededores de la ciudad de Albacete, en La Mancha. C: endorreísmo colgado de El Bonillo-El Ballestero, en el Campo de Montiel.

fondo plano y carácter salino-hipersalino (véase en Cirujano, 1990 y Herreros, 1992). El humedal de mayor tamaño es la laguna de Pétrola (174 ha de superficie máxima cubierta por el agua; Cirujano, Montes y García, 1988), donde se localizan dos islas, la mayor de unas 5,6 ha y la menor de 1,4 ha, de superficies máximas medidas sobre imágenes del satélite Sentinel y ortofotos PNOA (Instituto Geográfico Nacional, 2021).

La laguna de Pétrola tiene aguas hipersalinas, su carácter es semipermanente y está sometidas a estiaje pudiendo llegar a secarse en años con escasas precipitaciones (Cirujano, 1990).

2.2. Metodología

Con el fin de obtener datos sobre la presencia y reproducción de la pagaza piconegra en la provincia de Albacete, se recurrió a una petición de registros entre las personas aficionadas a la observación de aves en Albacete, con especial atención a miembros de la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO desde ahora). También se consultaron las bases de datos en internet donde podrían encontrarse citas puntuales. En concreto se revisaron: *Observation.org* (<https://observation.org/>), *eBird España* (<https://ebird.org/home>) y *Anuario Ornitológico de Albacete* on line (<https://anuario.albacete.org/>).