

Género y especie	WH								XH 16
	WII 44	WII 45	WII 46	WII 55	WII 56	WII 58	WII 65		
Subfamilia Cuculliinae (continuación)									
<i>Polymixis flavicincta</i> (D. & Schif., 1775)	+	—	—	+	+	—	—	—	
<i>Recoropha canteneri</i> (Duponchel, 1855)	—	—	—	—	—	—	—	+	+
<i>Spudaea ruticilla</i> (Esper, 1791)	+	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Valeria jaspidea</i> (Villers, 1789)	+	—	—	+	+	—	—	+	
<i>Xylena exsoleta</i> (L., 1758)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	—	—	—	—	+	—	—	—	
n.º de spp. por cuadrícula	4	5	1	10	19	—	3		
Número total de especies: 31.									
Subfamilia Euteliinae									
<i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813)	+	—	—	—	+	—	—	—	
n.º de spp. por cuadrícula	1	—	—	—	1	—	—	—	
Número total de especies: 1.									
Subfamilia Hadeninae									
<i>Discestra sodae</i> (Rambur, 1829)	—	—	—	—	—	—	—	—	+
<i>Discestra trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	—	—	—	—	+	—	—	—	+
<i>Hadena andalusica</i> (Staud., 1859)	—	—	×	—	+	—	—	—	
<i>Hadena compta</i> (D. & Schif., 1775)	—	—	—	—	—	—	—	—	+
<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Hadena perplexa</i> (D. & Schif., 1775)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Hadena sancta</i> (Staud., 1859)	+	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Lacanobia oleracea</i> (L., 1758)	—	—	—	+	+	—	—	—	+
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	—	+	—	—	—	—	—	—	
<i>Mamestr corsica</i> (Rambur, 1832)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mamestr dysodea</i> (D. & Schif., 1775)	+	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mythimna albipuncta</i> (D. & Schif., 1775)	+	—	—	+	+	—	—	—	
<i>Mythimna ferrago</i> (F., 1787)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mythimna l-album</i> (L., 1767)	—	□	—	—	+	—	—	—	+
<i>Mythimna loreyi</i> (Duponchel, 1827)	—	—	—	+	□	—	—	—	+
<i>Mythimna punctosa</i> (Treitschke, 1825)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mythimna putrescens</i> (Hübner, 1874)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mythimna riparia</i> (Rambur, 1892)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1855)	—	—	□	—	+	—	—	+	+
<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	—	—	—	—	—	—	—	—	+
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	+	×	—	+	—	+	—	—	+
<i>Orthosia cruda</i> (D. & Schif., 1775)	+	—	—	+	+	—	—	—	
<i>Orthosia gracilis</i> (D. & Schif., 1775)	—	—	—	+	—	—	—	—	
<i>Orthosia inverta</i> (Hufnagel, 1766)	—	—	—	—	+	—	—	—	
<i>Orthosia stabilis</i> (D. & Schif., 1775)	—	+	—	—	—	—	—	—	
<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	—	—	—	+	+	—	—	—	
<i>Panolis flammea</i> (D. & Schif., 1775)	—	+	—	+	—	—	—	—	
n.º de spp. por cuadrícula	5	5	3	9	19	1	3		
Número total de especies: 26.									