

*Tachys (Tachys) tetraphacus* Bedel. 1896

Elemento posiblemente mediterráneo meridional. Especie higrófila. Laguna de Pétrola.

*Tachyta (Tachyta) nana* (Gyllenhal. 1810)

Elemento holártico. Especie corticícola; marzo a julio y de octubre a noviembre. Embalse de Fuensanta.

Subtribu Bembidiina

*Asaphidion curtum curtum* Heyden. 1870

Elemento mediterráneo occidental. Especie ripícola; marzo a junio y de septiembre a noviembre. Embalses de Camarillas, Taibilla y Talave.

*Asaphidion rossii* (Schaum. 1857)

Elemento mediterráneo. Especie ripícola; marzo a julio. Embalses de Fuensanta y Taibilla.

*Bembidion (Bembidionetolitzkya) coeruleum*. Audinet-Serville. 1821

Elemento mediterráneo. Especie ripícola; marzo a julio. Embalses de Fuensanta, Taibilla y Talave.

*Bembidion (Diplocampa) assimile* Gyllenhal. 1810

Elemento paleártico occidental. Especie halófila. Lagunas de Ruidera. Saladar de Cordovilla.

*Bembidion (Diplocampa) clarkii clarkii* (Dawson. 1849)

Elemento europeo occidental. Especie higrófila; abril. Saladar de Cordovilla.

*Bembidion (Emphanes) axillare* (Motschulsky, 1844) (*rivularis* Dejean. 1831)

Elemento mediterráneo. Especie halófila. Lagunas de Pétrola y Ruidera.

*Bembidion (Emphanes) latiplaga latiplaga* Chaudoir. 1850

Elemento mediterráneo. Especie paludícola y ripícola; marzo a agosto. Embalses de Camarillas, Fuensanta, Taibilla y Talave. Lagunas de Ruidera.