

2.2. CATÁLOGO DE ESPECIES

A continuación se describen las 18 especies del género localizadas en la provincia de Albacete y en áreas limítrofes. Con el fin de simplificar la consulta del trabajo, obviamos la clasificación infragenérica y empleamos únicamente descripciones macroscópicas, remitiendo para un estudio más profundo de la sistemática y microscopía de los *Lactarius* a la completa revisión realizada por Llistosella (1999). Por el mismo motivo hemos agrupado las especies en función de caracteres sencillos, fácilmente apreciables a simple vista, como la coloración general así como la del látex y su posible viraje.

El nombre o nombres comunes que se señalan en cada ficha son los que hemos recogido en nuestro trabajo de campo en la provincia de Albacete.

Especies de coloración general blanca

Los *Lactarius* blancos, no deben confundirse con la especie popularmente conocida como “guíscano blanco” (*Russula delica* Fr.), ya que esta especie, muy frecuente en los pinares albaceteños, carece de látex y del sabor picante extremo de las especies de esta sección.

Lactarius vellereus (Fr.:Fr.) Fr.

Descripción: setas que se desarrollan solitarias. Sombrero de 10 a 20 cm de diámetro, embudado, blanco sucio, al tacto típicamente aterciopelado. Margen ondulado, se mantiene involuto hasta la completa madurez del hongo. Láminas primero blancas, luego de color parduzco, espaciadas, gruesas, decurrentes. Pie corto, blanco. Látex poco abundante, blanco e inmutable. Sabor ferozmente picante.

Ecología: especie de fructificación otoñal. Roldán y Honrubia (1992) la citan sobre suelos arenosos en pinares de *Pinus pinaster*. Nosotros la hemos recolectado en varias ocasiones en pinares y bosques mixtos mediterráneos, siendo una especie relativamente frecuente.

Observaciones: Llistosella (1999) considera esta especie como “muy común” en bosques mediterráneos de planifolios.