

3. RESULTADOS

Trinia castroviejai Gómez Nav., R. Roselló, E. Laguna, P. P. Ferrer, J. B. Peris, A. Guillén, A. Valdés & E. Sanchis, **sp. nov.**

Differens a Trinia ibericis. A T. glauca differt planta scabrida fructibus saepissime hispidulis. A T. dufourii differt fructibus multo majoribus. Ab amobus differt fructibus saepissime rugosis cum plicis elongatis, tuberculatis vel verrucosis.

[Distinta de las *Trinia* ibéricas. Se diferencia de *T. glauca* por ser planta escábrida, por sus frutos casi siempre hispídulos. Se diferencia de *T. dufourii* por sus frutos mucho mayores. Se diferencia de ambas por sus frutos casi siempre rugosos, con pliegues ± alargados, verruciformes o tuberculados.]

DESCRIPTIO. *Herba* dioica vel interdum monoica –andromonoica– perennis, plerumque monocarpica scabrida, primo viridis, demum saepe ± purpurascentis. **Radix** fusiformis vel napiformis. **Caulis** 9-54 cm altus erectus striatus generaliter ramosissimus valde flexuosus, basi residuis fibrosis petiolorum foliorum emortuorum stipato. **Folia inferiora** 2-3 pinnatisecta, laciniis 5-35 × 0,5-1 mm anguste linearibus leviter supracanaliculatis ± acutis scabridisque, petiolis membranaceis vaginantibus. **Folia superiora** sensim minora. **Inflorescentia** umbella composita, interdum simplex, pedunculis radiis longioribus, rarior absque pedunculo. Umbellae masculae radiis 4-10, 3-31 mm longis usque ad c. 0,5 mm latis laevibus aequalibus vel subaequalibus. **Umbellae femineae** radiis (2)4-8(9), longioribus –usque ad 44 mm– latioribus –usque ad c. 1 mm– plerumque clare inaequalibus, saepe reliquiis radiorum obsoletorum. **Umbellae hermaphroditae [plantarum monoicarum]** radiis 3-4 usque ad 38 mm longis. **Bractee** 0-4 generaliter lanceolatae acutae. **Umbellulae masculae** densae usque ad 15(20) flores. **Umbellulae femineae** densae vel laxae usque ad 10(12) flores. **Umbellulae hermaphroditae [plantarum monoicarum]** densae vel laxae usque ad 10(12) –flores masculini hermaphroditi vel ambis–. **Bracteolae** 0-6, minus 0,5 mm-c. 3 mm longae late triangulares vel lanceolati interdum ± dentati. **Flores** pedicellati vel subsessiles rarius sessiles pentameri calyce fere obsoleto. **Flores masculini** staminibus episepalis, petalis c. 1 mm longis integris subacuminatis alternis cum staminibus lanceolatis inflexis –apiculo involuto–, primo viridis angusto cum margine albido demum plerumque dorso et interdum intus purpurea vel violacea, stylopodio