

- Pelos glandulares dispersos. Lámina ovado-lanceolada. Pecíolo menos de dos veces la longitud de la lámina *Cheilanthes tinaei*
- 20. Pseudoindusio fimbriado.....*Cheilanthes acrostica*
- Pseudoindusio entero o denticulado *Cheilanthes maderensis*
- 21. Hojas de tamaño considerable (0,5-1 m). Indusio reniforme. Lámina bipinnada..... 22
- Hojas de tamaño más reducido. Indusios cuculados o laterales 24
- 22. Pecíolo y raquis muy paleáceo. Pínnulas con los lados paralelos, enteras o lobuladas *Dryopteris affinis*
- Pecíolo paleáceo sólo en la base 23
- 23. Lámina e indusio sin glándulas..... *Dryopteris filix-mas*
- Lámina densamente glandulosa, triangular lanceolada. Dientes grandes y agudos en el ápice de los segmentos de último orden
..... *Dryopteris submontana*
- 24. Indusio lanceolado, cuculado. Lámina de lanceolada a ovado-lanceolada 25
- Indusio lateral 26
- 25. Esporas con espinas cónicas *Cystopteris fragilis*
- Esporas rugosas, con la superficie granulosa *Cystopteris dickieana*
- 26. Hojas simples, segmento terminal rómbico *Asplenium celtibericum*
- Hojas pinnadas..... 27
- 27. Lámina simplemente pinnada 28
- Lámina 2-4 veces pinnada 29
- 28. Lámina y peciolo cubiertos densamente de pelos glandulosos.....
..... *Asplenium petrarchae* subsp. *petrarchae*
- Lámina y peciolo glabros 33
- 29. Planta de pequeño tamaño. Pecíolo verde, castaño sólo en la base. Pínnulas romboidales *Asplenium ruta-muraria*
- Planta de mayor tamaño 30