

DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ESTATUS DEL TARRO BLANCO (*TADORNA TADORNA*), EN LOS HUMEDALES DE ALBACETE (CASTILLA-LA MANCHA)

DISTRIBUTION ABUNDANCE AND STATUS OF COMMON SHELDUK (*TADORNA TADORNA*) IN THE WETLANDS OF ALBACETE (CASTILLA-LA MANCHA)

Juan PICAZO TALAVERA^{1, 2}

Recibido: 26 de septiembre de 2020

Aprobado: 5 de febrero de 2021

Cómo citar este artículo:

Picazo, J. (2021). Distribución, abundancia y estatus del tarro blanco (*Tadorna tadorna*), en los humedales de Albacete (Castilla-La Mancha). *Sabuco*, 15: 7-26.

http://doi.org/10.37927/sabuco.15_1

Autor para correspondencia: Juan Picazo picazotalavera@gmail.com

RESUMEN

Para el estudio de la distribución, abundancia y estatus del Tarro blanco (*Tadorna tadorna*) en los humedales de Albacete (Castilla-La Mancha, SE de España), se recurrió a distintas fuentes de información: citas puntuales, bases de datos en internet, informes inéditos y trabajo de campo. En el último caso se realizó el seguimiento mensual de la especie entre 2013 y 2019 (ambos inclusive), en el complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, como lugar conocido de presencia preferente en Albacete.

Se recopilaron 1 564 registros correspondientes a 15 682 aves, vistas en 81 localidades. El 96,5% de los tarros se observaron en el complejo de Pétrola, suponiendo el 64,0% de las localidades con citas en la provincia. Ocho de sus lagunas reunieron el 86,5% de las aves del complejo y el 74,3% de los registros. Destacó la laguna de Pétrola en ambos parámetros.

Las primeras observaciones de tarros blancos, entre 1985 y 1998, fueron prácticamente todas en época invernal, apareciendo de forma irregular y en escaso número, detectados básicamente en la laguna de Pétrola.

1 Sociedad Albacetense de Ornitología.

2 Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" de la Excm. Diputación de Albacete.