

CARACT. MASA. Grupo de galería donde el olmo, con una $h_0 = 10$ m, se mezcla con otras especies, en gran espesura.

K	10	15	20	25	30	35	40	>45	TOTAL
Nº	42	28	28	17	8	4	-	-	127

VEGET. Ribera muy espesa, que permite el tránsito por dentro: mezcla con chopos, fresnos, higueras, nogales, granados, cornejo, varias salgas, y trepadoras como madre selvas, clemátide, zarzas, rosas, etc.

OBS. Las características morfológicas del olmo denotan rasgos de hibridación con *U. pumila*: ramillos no llenos de hojas, dentición pumiloide, brotes más largos, copas más abiertas y difusas (M^a E. García-Nieto Rivero, Abril de 1995).

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
1.5.94	-	N	-	buen estado
8.8.94	L	N	A1	debilidad en ramillos terminales
2.9.94	L	N	A1	sin cambios
24.4.95	-	-	-	abundante fructificación y vigor en el follaje
16.6.95	-	-	-	buen estado sanitario, sin plagas ni enfermedad
27.7.95	-	-	-	se detecta presencia escasa de <i>Galeruca</i> , el aspecto es sanísimo
17.8.95	-	-	-	se observa un ramillo terminal con típicos síntomas de Grafiosis, lo que pudiera ser un inóculo de <i>Escolítidos</i> : ver evolución

Río de Angorrilla. 538.539; 4.274.003; 980 m.

LOC. Aguas abajo del puente de la carretera de Reolid a Salobre, en las márgenes del río.

DESCRIP. Grupo reducido; olmeda "residual" de tan sólo 30 pies adultos, siendo el resto chirpial de considerable volumen, que presenta el 20% del conjunto seco (con escolítidos), y defoliación C3 por ataque moderado de *Galeruca* y sintomatología clara de Grafiosis. El aspecto general es débil y enfermo. Presencia de 2 subespecies de *Ulmus minor*; una con las típicas costillas corchosas longitudinales.

Cortijos de los Marines. 540.149; 4.271.267; 940 m.

LOC. Junto al Río de Salobre, aguas arriba del pueblo. Se llega a ellos por un carril que sale de Salobre.