

DESCRIP. Grupo ubicado en las acequias de riego junto al camino citado y las huertas. Masa joven, formada principalmente por chirpiales que llegan como máximo a la clase latizal.

Estrecha franja a lo largo de los linderos de olmos sanos en general, con alguna debilidad y marchitez en ramillos terminales. Se aprecian varios rebrotes muertos con escolítidos (2.5.94), y la quema de gran parte del grupo (Agosto del 94), manteniéndose el resto sanos a excepción de los daños de Galeruca.

Río de Salobre.

En él distinguiremos varios grupos, de forma discontinua, aguas abajo desde los Cortijos de los Marines:

CARACT. MASA. Son grupos de características muy comunes, con sensibles diferencias de formación según el tramo que ocupan.

K	10	15	20	25	30	35	40	TOTAL	H ₀
A	14	7	2	1	-	-	1	25	9
B	24	10	5	2	3	-	-	44	9.5
C	37	15	11	4	3	1	1	72	12
D	65	29	10	5	1	-	-	110	13
E	28	23	12	7	6	-	-	76	10

A, B y C: en los Cortijos de Los Marines; D: huertas aguas abajo; E: antigua Fábrica de Paños.

VEGET. Bosquete de galería espeso y con representación de todas las especies típicas anteriormente citadas, pero alcanzando un mayor desarrollo debido al encajonamiento del cauce (taludes verticales). Alternancia con choperas y zonas abiertas, coto de pesca.

OBS. Las características morfológicas de estos grupos de olmos indican al parecer gran pureza genética (M^a E. García-Nieto, Abril 1995). En zonas de mezcla espesa con choperas los fustes de los olmos son estirados y cilíndricos.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
2.5.94	-	N	-	buen estado y vigor
8.8.94	L	N	A1	marchitez en algunos ramillos
2.9.94	L	N	A1	sin cambios
24.4.95	-	N	-	abundante fructificación
16.6.95	-	S	A1	marchitez en ramillos terminales; rebrotes aislados muertos (infección)
27.7.95				masa vigorosa, muy sana, con presencia escasa de Galeruca y sin claros indicios de Grafiosis.