

Río del Ojuelo.

Se aprecian en este valle varios grupos considerablemente separados entre sí, lo que nos lleva a diferenciarlos según:

El Ojuelo. 540.028; 4.266.242; 1.190 m.

LOC. Aldea a 6 km de Salobre a la que se accede por una carretera local.

CARACT. MASA. A su vez observamos tres grupos claramente distinguibles, a lo largo de las márgenes del río en dicha aldea.

K	10	15	20	25	30	35	TOTAL	H ₀
A	18	8	4	4	2	2	38	12
B	78	32	20	5	1	–	136	9
C	55	16	11	2	–	–	84	9

VEGET. Acompañan a los olmos en el dosel arbóreo fresnos, chopos, nogales y cerezos, y en el arbustivo/trepador salgas, vid, juncales, madreselvas, rosas, ...siendo abundantes las matas de heleboro.

OBS. Es muy notoria en el grupo B la coetaneidad de la masa en clases latizal y fustal, siempre originadas por rebrotes de cepa, lo que indica una antigua tala de la olmeda, con la finalidad de su aprovechamiento maderero. El rodal B muestra claras diferencias con los otros dos en cuanto a su morfología foliar, ramificación y colorido, tratándose de otra variedad a buen seguro.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
2.5.94	–	N	–	incipiente foliación y gran producción de semilla
8.8.94	P	N	A1	un pie puntiseco
2.9.94	L	N	A1	sin cambios
24.4.95	–	N	–	abundante fructificación
16.6.95	–	N	–	foliación vigorosa
17.8.95	–	–	–	masa completamente sana

Vega Río del Ojuelo. 539.164; 4.269.783; 1.020 m.

LOC. En las márgenes del río, visible desde la carretera local de Salobre a El Ojuelo, a 1 km del pueblo.

CARACT. MASA. Grupo reducido en el que se distinguen dos núcleos,