

constituyendo una franja marginal de los cultivos horto-frutícolas, junto al cauce. La alt. dom. se sitúa en los 10 m.

K	10	15	20	25	30	35	40	>45	TOTAL
D	10	4	3	4	4	3	-	1	29
E	10	3	2	7	3	-	-	-	25

VEGET. Galería espesa, donde el gran desarrollo no permite llegar al borde del cauce.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
2.5.94	-	N	A1	marchitez en ramillos terminales (grupo D)
8.8.94	L	N	A2	síntomas de Grafiosis en grupo D
16.6.95	P	S	A3	varios pies muertos; síntomas de Grafiosis
27.7.95	-	-	-	los indicios (puntisecado típico) no avanzan desde el año anterior

Unión R. Ojuelo-R. Salobre. 538.889; 4.271.631; 915 m.

LOC. Visible desde la salida de Salobre hacia El Ojuelo; se accede a él tomando el camino hacia abajo en lugar de la carretera local citada.

CARACT. MASA. Se distinguen 2 grupos en las márgenes del R. de El Ojuelo hacia la unión:

* F, en la margen derecha del río, formando una larga franja en galería muy espesa.

* G, en la margen izquierda, por lo que es preciso cruzar el río para acceder a él. Si lo hacemos desde el rodal F, se encuentra un paso al final del mismo, habiendo de desplazarnos para llegar a él unos 200 m aguas abajo siguiendo dicho margen. Las alturas dom. se sitúan en 12 metros.

K	10	15	20	25	30	35	40	>45	TOTAL
F	67	14	16	15	4	8	2	-	126
G	24	15	8	10	6	2	1	-	66

VEGET. El grupo F presenta la típica formación de mezcla en las comunidades ripícolas de la zona, pero el G se encuentra mezclado con chopos de plantación en parte, siendo el resto un grupo puro de olmeda.

OBSERV. En el grupo G se observan varios pies de olmos con rasgos atípicos en la morfología foliar, pertenecientes a estirpes europeas que sería necesario determinar con detenimiento, posiblemente de procedencia holandesa (M^a E. García-Nieto Rivero, 24.4.95).