

Valdeganga, 14-VII-1989.

El cuerpo presenta una granulación general irregular. El borde posterior del pronoto se prolonga hacia atrás formando un diente a cada lado del escudete. La coloración varía de amarillenta a negruzca; los bordes del abdomen tienen una alternancia de bandas ocreas y amarillas. Alcanza 9-11 mm de longitud.

Son chinches de hábitos fitófagos pero de escaso interés económico; se alimentan de los brotes en desarrollo de diversas plantas y cultivos.

Familia *Lygaeidae*

Lygaeus militaris F.

Valdeganga, 14-VII-1989.

Esta especie presenta una viva coloración roja con manchas negras sobre la cabeza, protórax y borde externo de los élitros. La membrana de los élitros es negra con una mancha blanca central redonda y dos líneas arqueadas cerca de la base. Mide 10-12 mm.

Al igual que todas las especies del género, tiene costumbres depredadoras o detritívoras. Estos chinches se encuentran sobre el sustrato vegetal y tienen gran movilidad para conseguir cazar sus presas ya que se desplazan rápidamente e incluso son buenos voladores.

ALCACHOFA (*Cynara scolymus* - Compositae)

Es una planta originaria de la región mediterránea y las Islas Canarias. Las flores forman una inflorescencia globular cubierta con numerosas brácteas. Crece mejor en tierras bajas cerca de la costa.

En la vega del río Júcar la alcachofa no constituye un cultivo de gran escala, aparece en varias parcelas de huerta a lo largo de la vega del río pero siempre con un número de plantas reducido.

Orden Hymenoptera

Familia *Eulophidae*

Subfamilia *Eulophinae*

Pnigalio agraulis (Walker)

Valdeganga, 14-VII-1989.

La mayoría de especies de este género parasitan a minadores de hojas y sus parásitos. Algunos parasitan a himenópteros tentredínidos formadores de agallas. Los hospedadores citados son coleópteros de las familias *Chrysomelidae* y