

diseño muy llamativo de bandas longitudinales blancas y negras. Es una lagartija típica de suelos arenosos en zonas secas con escasa vegetación. De procedencia norteafricana, es una especie bastante termófila. No poseemos datos propios de distribución para esta especie, aunque ha sido citada como presente en las áreas más áridas de nuestra provincia (Manzanares, 1980). El único punto concreto de distribución hallado en la literatura es el Río Segura (Ruiz et al. 1989).

6. LAGARTIJA DE VALVERDE *Algyroides marchi*

Lagartija esbelta, de pequeño tamaño, con collar, caracterizada por las escamas dorsales grandes y escamas laterales granulares no carenadas. Suele ser de tonos verdosos con costados oscuros con manchitas blancas. El vientre es amarillo. Se trata de una especie endémica de las sierras de Alcaraz-Segura-Cazorla (Palacios et al. 1974) que no fue descrita hasta 1958. Hemos encontrado esta especie de lagartija en tres ocasiones en dos localidades.

Los Chorros

20-7-91. Seis ejemplares en el cauce seco del río Mundo.

21-7-91. >10 ejemplares.

Fuente de la Guitarra

21-7-91. 1 ejemplar en una pared rocosa.

<u>MES</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
Enero	—
Febrero	—
Marzo	—
Abril	—
Mayo	—
Junio	—
Julio	17
Agosto	—
Septiembre	—
Octubre	—
Noviembre	—
Diciembre	—

7. LAGARTIJA COLILARGA *Psammodromus algirus*

Lagartija grande, robusta, con cola muy larga. Escamas del cuerpo grandes y carenadas, lo que le da un aspecto «áspero». Presenta típicamente un par de líneas claras en cada costado bordeadas por líneas más oscuras. El color de fondo habitual es pardo con tonos siena a rojizos en la parte posterior. La parte ventral