

CLASIFICACION BIOGEOGRAFICA DE LAS ESPECIES CENSADAS

(Según criterios clasificatorios de Calle Pascual, J. A.; 1982)

	<u>Número de especies</u>	<u>Porcentaje del total</u>
EUROASIATICAS	33	22,6%
PALEARATICAS	6	4,1%
COSMOPOLITAS	7	4,7%
HOLARTICAS	4	2,7%
ENDEMICAS	1	0,6%
ETIOPICAS	1	0,6%
ASIATICO-MEDITERRANEAS	29	19,8%
ATLANTO-MEDITERRANEAS	36	24,6%
ASIATICO-SUBMEDITERRANEAS	2	1,3%
ASIATICO-SUPRAMEDITERRANEAS	19	13,1%
SUBTROPICAL	8	5,4%

**INDICES**

Índice sistemático de los NOCTUIDAE censados en la zona sur de la provincia de Albacete.

Subfamilia *Noctuinae*

Euxoa obelisca  
 Agrotis segetum  
 Agrotis exclamationis  
 Agrotis ipsilon  
 Agrotis puta  
 Agrotis obesa  
 Agrotis dirempta  
 Agrotis crassa  
 Cladocerotis optabilis  
 Ochropleura forcipula  
 Ochropleura flammatra  
 Ochropleura plecta  
 Ochropleura leucogaster  
 Eugnorisma pontica  
 Noctua pronuba  
 Noctua comes  
 Noctua fimbriata  
 Noctua janthina  
 Paradiarsia glareosa

Peridroma saucia  
 Xestia c-nigrum  
 Xestia xanthografa  
 Xestia kermesina  
 Cerastis faceta

Subfamilia *Heliothinae*

Heliothis viriplaca  
 Heliothis peltigera  
 Heliothis armigera  
 Rhodocleptria incarnata

Subfamilia *Hadeninae*

Discestra trifolii  
 Discestra sodae  
 Pachetra sagittigera  
 Mamestra w-latinum  
 Mamestra oleracea  
 Mamestra corsica  
 Mamestra dysodea