

La serie F (foto 6) se ubicó en terrenos dominados por la asociación del carrizal halófilo (*Junco maritimi-Phragmitetum australis*), mezclados con juncos de la asociación *Elymo curvifolii-Juncetum maritimi*.

El periodo de muestreo de estas series de trampas fue desde enero hasta la mitad de julio de 2000; el muestreo se suspendió porque no cayeron carábidos, probablemente debido a la sequedad y las altas temperaturas. Las trampas se revisaron cada dos semanas.

Además de estas trampas en serie se colocaron otras aisladas en 7 lugares del saladar, para obtener datos de tipo cualitativo y completar así los datos procedentes de las capturas a mano, con aspirador, etc. La fig. 2 indica la posición de estas trampas en el saladar. Se revisaron con la misma frecuencia que las trampas en serie.

3. RELACIÓN DE ESPECIES DE CARABIDAE COLECTADAS EN EL SALADAR DE CORDOVILLA (ALBACETE)

Subfamilia CICINDELINAE Latreille 1802

Tribu **Cicindelini** Latreille 1802

1. *Megacephala (Grammonatha) euphratica* Dejean 1822
2. *Cicindela (Cicindela) campestris* Linnaeus 1758
3. *Cicindela (Cicindela) maroccana pseudomaroccana* Roeschke 1891
4. *Cicindela (Calomera) littoralis* Fabricius 1787
5. *Cephalota (Cassolaia) maura* (Linnaeus 1758)
6. *Myriochile melancholica* (Fabricius 1798)
7. *Cylindera (Cylindera) paludosa* (Dufour 1820)

Subfamilia CARABINAE Latreille 1802

Tribu **Carabini** Latreille 1802

1. *Calosoma (Campalita) maderae indagator* (Fabricius 1787)

Tribu **Nebriini** Laporte de Castelnau 1834

1. *Leistus (Pogonophorus) expansus* Putzeys 1874
2. *Leistus (Leistus) fulvibarbis* Dejean 1826

Tribu **Siagonini** Bonelli 1813

1. *Siagona europaea* Dejean 1826