

Tribu **Lebiini** Bonelli 1810

1. *Cymindis (Cymindis) lineola* Dufour 1820
2. *Platytarus famini* (Dejean 1826)
3. *Lebia (Lamprias) cyanocephala* (Linnaeus 1758)
4. *Lebia (Lebia) trimaculata* (Villiers 1789)
5. *Demetrias (Demetrias) atricapillus* (Linnaeus 1758)
6. *Paradromius (Manodromius) linearis* (Olivier 1795)
7. *Philorhizus melanocephalus* (Dejean 1825)
8. *Syntomus fuscomaculatus* (Motschoulsky 1844)
9. *Microlestes corticalis* (Dufour 1820)
10. *Microlestes abeillei* (Brisout de Barneville 1885)
11. *Mesolestes scapularis* (Dejean 1829)

Tribu **Zuphiini** Bonelli 1810

1. *Zuphium olens* (Rossi 1790)
2. *Polistichus connexus* (Fourcroy 1785)

Tribu **Dryptini** Bonelli 1810

1. *Drypta dentata* (Rossi 1790)

Tribu **Brachinini** Bonelli 1810

1. *Brachinus (Brachinus) plagiatus* Reiche 1868

#### 4. RELACIÓN DE CAPTURAS

Para cada especie se indican en primer lugar las capturas cuantitativas en las distintas series de trampas (A-F), seguidas de las capturas de tipo cualitativo (capturas a mano, con luz, trampas de caída aisladas con numeración 1 a 7, etc.) y datos diversos sobre la biología. A continuación figuran los datos de distribución mundial y la tolerancia a la sal.

*Megacephala (Grammonatha) euphratica* Dejean 1822

En trampa de caída (mayo) y a mano entre mayo y julio. En lugares despejados de vegetación donde están ubicadas las galerías de las larvas. Nocturna. Elemento mediterráneo meridional-oriental. Especie halobia.