

*Cicindela (Cicindela) campestris* Linnaeus 1758

Trampa de caída (marzo) y observada entre febrero y mayo en las zonas alejadas de la salinidad, en los caminos y terrenos despejados. Elemento paleártico. Haloxeno.

*Cicindela (Cicindela) maroccana pseudomaroccana* Roeschke 1891

Trampa de caída (abril) y capturada a mano entre febrero y mayo en terrenos con mayor contenido salino que la especie anterior. Elemento bético rifeño. Haloxeno.

*Cicindela (Calomera) littoralis* Fabricius 1787

Colectada en julio en pleno saladar pero en suelo húmedo. Elemento mediterráneo. Especie halófila.

*Cephalota (Cassolaia) maura* (Linnaeus 1758)

Encontrada entre mayo y agosto en lugares frescos con humedad o cerca de cursos de agua. Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila.

*Myriochile melancholica* (Fabricius 1798)

Estación B en julio. Colectada a mano de junio a septiembre. Especie atraída por la luz artificial, permaneciendo en la zona iluminada donde caza otros insectos. Prefiere lugares con humedad. Elemento etiópico oriental. Halófilo.

*Cylindera (Cylindera) paludosa* (Dufour 1820)

Estaciones A y B en ambas series, y de abril a septiembre, siendo más abundante en verano en enclaves palustres. Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila.

*Calosoma (Campalita) maderae indagator* (Fabricius 1787)

Un único ejemplar en la estación 7, en abril. Elemento mediterráneo occidental. Especie haloxena.

*Leistus (Pogonophorus) expansus* Putzeys 1874

Un solo un ejemplar bajo el mantillo de *Tamarix canariensis*, lapidícola. Elemento bético rifeño. Especie haloxena.