

Ejemplares capturados con la manga entomológica en una parcela de trigo segado.

Subfamilia *Braconinae*

Bracon (Glabrobracon) hemiflavus Szépligeti

Las Eras, 13-VII-1989.

Los ejemplares capturados lo han sido con la manga entomológica en una parcela de trigo segado.

Se ha citado como parásito de varias especies de coleópteros de la familia *Curculionidae*.

Habrobracon hebetor Say

Canto Blanco, 16-VII-1989.

Las Eras, 13-VII-1989.

Los ejemplares capturados han sido recolectados con la manga entomológica en parcelas de trigo seco, en la primera localidad, y en parcelas ya segadas, en la segunda localidad (Foto 9).

Familia *Ichneumonidae*

Subfamilia *Anomalinae*

Anomalon sp.

Las Eras, 13-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica en una parcela de trigo segado (Lám. II).

Orden **Lepidoptera**

Familia *Noctuidae*

Acontia dilucida (HB)

Canto Blanco, 16-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica en una parcela de trigo.

Las orugas del lepidóptero se alimentan de malváceas silvestres.

Orden **Orthoptera**

Familia *Acrididae*

La familia Acrididae engloba las langostas y los saltamontes; ocupan los