

medios más diversos como bosques, herbazales, áreas arbustivas y lugares desnudos de vegetación. Son vegetarianos, con diferentes grados de polifagia aunque también se dan formas carnívoras y algunos casos de canibalismo. Su alimentación predominantemente fitófaga les convierte, bajo ciertas condiciones, en insectos perjudiciales para los cultivos al producir daños de enorme magnitud.

Los principales cultivos que generalmente atacan son los cereales y otras gramíneas, y también algunos cultivos y hortalizas como alfalfa, alforfón, algodón, lino, patatas, tabaco y tomates.

Acridium aegyptium (L.)

Canto Blanco, 16-VII-1989.

Ejemplares capturados en un campo de trigo seco.

VID (*Vitis vinifera* - Vitaceae)

La vid es una de las plantas más antiguamente cultivadas, probablemente originaria del oeste de Asia.

La vid constituye uno de los cultivos más importantes del área estudiada ya que ocupa grandes extensiones y constituye uno de los principales recursos económicos de la meseta albacetense. Aunque la vid tiene importantes plagas reconocidas, en ningún caso hemos localizado alguno de los insectos característicos que la atacan.

Orden Hymenoptera

Familia *Sphecidae*

Subfamilia *Ammophilinae*

Podalonia tydei senilis Dahlbom

Casas de Ves, 28-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica en un campo de vid.

Orden Orthoptera

Familia *Oedipoda caerulescens* (L.)

Zulema, 15-VII-1989.

Capturado sobre una planta de vid.