

Familia *Membracidae*

En los adultos el pronoto está ensanchado y se extiende hacia atrás, sobre el escutelo y abdomen. Las ninfas suelen ser gregarias.

Stictocephala bisonia

Alcalá del Júcar, 14-VII-1989.

Ejemplares capturados sobre una planta del género *Amaranthus*.

Esta especie se ha citado como perjudicial para los plantones de frutales por destruir los brotes cuando el insecto realiza la puesta. Las larvas se desarrollan sobre plantas herbáceas como la alfalfa de la que se considera una plaga menor. Infestan las hojas, chupando la savia; pueden ser vectores de virus.

Orden *Neuroptera*

Familia *Chrysopidae*

Chrysopa vulgaris L.

Alcalá del Júcar, 14-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica cuando se encontraban sobre una planta del género *Amaranthus*.

CHOPERA (*Populus nigra*)

Orden *Hymenoptera*

Familia *Braconidae*

Subfamilia *Braconinae*

Bracon (Bracon) alutaceus Szépligeti

Alcalá del Júcar, 28-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica barriendo sobre gramíneas en una chopera junto al río.

Es un parásito del que no se conoce ningún hospedador.

Bracon (Bracon) leptus Marshall

Alcalá del Júcar, 28-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica barriendo sobre gramíneas en una chopera junto al río (Lám. II).

De este parásito únicamente se conoce un hospedador, el lepidóptero gelechido *Metzneria lapella* L. que es un minador de diversas gramíneas.