

Subfamilia *Mesochorinae**Mesochorus temporalis* Thomson

La Recueja, 14-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica en una chopera.

Subfamilia *Orthocentrinae**Orthocentrus* sp.

Alcalá del Júcar, 28-VII-1989.

Ejemplares capturados barriendo con manga entomológica sobre gramíneas en una chopera junto al río.

Subfamilia *Pimplinae**Tromatobia* sp.

La Recueja, 14-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica en una chopera.

Familia *Sphecidae*

Las larvas de los esfécidos son exclusivamente carnívoras y las hembras de las diferentes especies proveen sus larvas con un amplio rango de insectos y arañas como presas. Muchos esfécidos hacen nidos cuya estructura es más o menos complicada.

Subfamilia *Sphecinae**Prionyx kirbii* (Vd.Lin.)

Jorquera, 28-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica barriendo sobre gramíneas en una chopera junto al río.

Familia *Eumenidae*

Son avispas solitarias que construyen nidos en tierra o en tallos de plantas y túneles de coleópteros taladradores de la madera. Las principales presas de los euménidos son larvas de lepidópteros, principalmente geométridos y tortricidos, y larvas de coleópteros, principalmente de las familias *Curculionidae* y *Chrysomelidae*.

Antepipona deflenda (Saund.)

Jorquera, 28-VII-1989.

Ejemplares capturados con manga entomológica barriendo sobre gramíneas en una chopera junto al río.