

*Lactarius hepaticus* Plowr.

**Descripción:** setas que se desarrollan en grupos de numerosos ejemplares unidos por la base. Sombrero marrón rojizo, de 4 a 9 cm de diámetro, aplanado o algo embudado con un amplio mamelón central. Láminas ligeramente decurrentes, de color crema. Pie de color similar al del sombrero, alargado, de longitud similar o superior al diámetro del sombrero. Látex blanco que vira a amarillo al oxidarse. Carne picante.

**Ecología:** especie característica de pinares. Según el trabajo de Roldán y Honrubia (1992), se trata de una especie frecuente en los pinares húmedos de la provincia.

**Observaciones:** su nombre científico alude a la coloración típica de esta especie, ya que el tono marrón rojizo de estas setas recuerda al color de un hígado.

*Lactarius mediterraneensis* Llistosella & Bellú

**Descripción:** setas que se desarrollan solitarias, aunque, a menudo, en un mismo rodal se encuentran numerosos ejemplares. Sombrero anaranjado, de 10-15 cm, característicamente escrobiculado (cubierto de numerosos hoyitos), aplanado y luego ampliamente embudado. Láminas adnatas o algo decurrentes, de color crema. Pie corto, recio, hueco en la madurez. Látex escaso, inicialmente blanco y luego amarillento. Carne picante.

**Ecología:** especie mediterránea recientemente descrita que hemos podido observar en los montes de la Sierra de Almansa. Pérez-De-Gregorio y Rodríguez (com. pers.) la citan para la Sierra de Alcaraz. Mahiques y cols. (1999) la citan para el valle de Albaida. Establece micorrizas con árboles del género *Quercus* como carrascas y quejigos. Moreno y cols. (2002) indican que se trata de una especie propia de encinares sobre suelos calizos, citándola como muy frecuente en la provincia de Guadalajara.

**Observaciones:** en el campo se seca fácilmente si la climatología acompaña, en este caso, las setas perduran secas durante meses entre la hojarasca.

*Especies con pelos en el sombrero*

Margen del sombrero peludo, al menos en los ejemplares jóvenes. En muchas de las guías de campo usuales únicamente se describe con esta característica *Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray, que establece micorrizas con abedules, por lo que es claramente descartable para la