

## BIOGEOGRAFÍA

La división biogeográfica del suroeste de la provincia de Albacete ha quedado puesta de manifiesto en diversas aproximaciones —Alcaraz et Sánchez-Gómez, (1988), Rivas-Martínez (1987), Sánchez-Gómez, (1990)—. En esta división influyen diversos factores edafoclimáticos, corológicos, geológicos, florísticos, fitosociológicos, históricos, etc. En su conjunto, cada rango jerárquico presenta unos elementos florísticos característicos y/o exclusivos que lo definen y que pueden considerarse como endemismos.

Dentro del suroeste de Albacete podemos distinguir la siguiente división biogeográfica (Ver Mapa de Biogeografía).

### Provincia Bética

#### Sector Subbético

Subsector Subbético-Murciano

Subsector Alcaracense

Subsector Cazorlense

### Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega

#### Sector Manchego

Subsector Manchego-Murciano

### Provincia Murciano-Almeriense

#### Sector Alicantino-Murciano

Subsector Murciano-Septentrional

## BIOCLIMATOLOGÍA

La zona objeto de estudio presenta una gran variabilidad climática, hecho que incide en la biogeografía y, en definitiva, en la composición florística.

Teniendo en cuenta la temperatura (termotipos) y la pluviometría (ombrotipos) (Rivas-Martínez et al, 1984; Rivas-Martínez, 1987) en el territorio estudiado pueden reconocerse:

### a) Termotipos:

El descenso de la temperatura respecto al aumento de la altitud es un