

Laguna de los Patos

13-9-89. Atropellada.

La Gila

24-5-92. Muda incompleta.

Las Mariquillas

28-9-87. Individuo adulto localizado en el interior de un aljibe.

Los Llanos

30-6-87. Atropellada en la carretera.

Puente de Mahora

17-6-89. Atropellada.

<u>MES</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
Enero	—
Febrero	—
Marzo	—
Abril	—
Mayo	4
Junio	2
Julio	—
Agosto	—
Septiembre	6
Octubre	—
Noviembre	—
Diciembre	—

13. CULEBRA DE COLLAR *Natrix natrix*

Culebra mediana a grande, con escamas carenadas en 19 hileras en la mitad del cuerpo. Diseño uniforme grisáceo u oscuro, con un moteado negro. La subespecie ibérica (*N. n. astreptophora*) presenta el iris rojo. Los juveniles presentan un «collar» amarillento bordeado de negro, que se pierde en los adultos. Normalmente ligada al agua. Habita la mayor parte de Europa (Arnold y Burton, 1982). Citada en la Laguna Ojos de Villaverde (González et al. 1991) y Río Segura (Ruiz et al. 1989). Aportamos cuatro observaciones en cuatro localidades nuevas. La escasez de observaciones de esta especie nos impide hacer un análisis fenológico.

El Arquillo

1-5-85. Ejemplar muerto junto a la Laguna Grande. 35 cm.