

Laguna de Alboraj

26-9-87. Muda.

Laguna Ojos de Villaverde

11-9-90. Muda.

Las Mariquillas

21-9-84. Muda de 42 cm de longitud total.

<u>MES</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
Enero	—
Febrero	—
Marzo	—
Abril	—
Mayo	1
Junio	—
Julio	—
Agosto	—
Septiembre	3
Octubre	—
Noviembre	—
Diciembre	—

14. CULEBRA VIPERINA *Natrix maura*

Culebra pequeña a mediana, de cuerpo relativamente esbelto, con escamas carenadas, con 18 a 21 hileras en mitad del cuerpo. Diseño dorsal variable, amarillento, rojizo o pardo, usualmente con un diseño de marcas oscuras en el dorso en forma de zig-zag, que recuerda mucho al de las víboras (morfotipo con diseño en zig-zag). En los costados hay marcas redondeadas. Hay ejemplares con un par de líneas longitudinales claras (morfotipo listado). Asociada a ríos, arroyos, balsas y otras aguas dulces estancadas. Es frecuente verla nadar, con la cabeza fuera del agua o termorregular en las orillas, desde donde se lanza al agua al menor peligro. Es inofensiva, aunque si es acorralada bufa y aplana la cabeza, asimilándose aún más a una víbora. Si es capturada, suele liberar el contenido de su cloaca, de olor fétido. Se distribuye por la Península Ibérica, Francia y Cerdeña (Arnold y Burton, 1982). Se había citado en Riópar, El Jardín, Laguna Ojos de Villaverde (González et al. 1991) y Río Segura (Ruiz et al. 1989). Nosotros hemos realizado 20 observaciones en otras 11 localidades. La época de actividad parece extenderse desde Abril hasta Noviembre.

Bolinchés

23-5-92. Dos ejemplares en la laguna.