

Bisbita Común (*Anthus pratensis*): Familia *Motacillidae*, orden *Passeriformes*. Aunque existen algunas citas estivales y de cría en el norte, se puede considerar un ave invernante en España. Durante el invierno, la Península Ibérica y Baleares reciben importantes contingentes de aves procedentes del Paleártico occidental, que se reparten ocupando preferentemente medios deforestados, siendo muy abundantes en campiñas de la región Eurosiberiana, así como en pastos y regadíos del termomediterráneo y localidades más abrigadas del mesomediterráneo. En la Península Ibérica y Baleares se han recuperado individuos anillados en Bélgica (275), Reino Unido (127), Holanda (59), Alemania (27), Francia (25), Suecia (20), Noruega (16), Finlandia (15), Países Bálticos (11), Islandia (10), Suíza (7), antigua Checoslovaquia (6), Laponia (5), Dinamarca (4), Polonia (3) y Rumania (2) (Tellería et al, 1999).

Para Albacete, nuestros registros de capturas ($n=93$) nos presentan a este bisbita como una especie netamente invernante, con presencia entre octubre y abril y máximos en diciembre y enero (datos propios). Así mismo, hemos comprobado su filopatría al lugar de invernada al controlar individuos en el mismo lugar de su anillamiento durante el siguiente invierno.

En este estudio solamente realizamos una captura a finales de octubre (período 12), que resultó ser un ave adulta (edad 4), y sexo indeterminado.



Figura 19. Capturas de Bisbita Común (*Anthus pratensis*):

BARRAS = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las medidas encontradas para este único individuo fueron: **Ala** = 76.5 mm; **Tarso** = 20.2 mm y **Peso** = 16 grms. Su nivel de grasa se estimó en 3.