



Figura 24. Capturas de Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*).

Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las Tarabillas Norteñas medidas ofrecieron los siguientes datos: **Ala** = 76.5-80 mm, media 77.9 (n=11); **Tarso** = 20.7-23.5 mm, media 22.0 (n=11) y **Peso** = 17.5-23 grms, media 19.8 (n=11).

Estas tarabillas presentaron unos valores de grasa comprendidos entre 3 y 5, media 4.3 (n=11).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*): Familia *Turdidae*, orden *Passeriformes*. Se reparte en época de cría por toda la Península y Baleares, ocupando matorrales, campiñas, claros de bosque, así como cultivos y pastizales con arbustos dispersos. Parece ser más abundante en el piso termomediterráneo (Tellería et al, 1999).

Durante el otoño, en la Península coinciden en movimiento, aves nativas que abandonan los pisos más fríos para instalarse en zonas más térmicas con aves foráneas que llegan para invernar, o en paso hacia el norte de África. Existen recuperaciones de aves anilladas en Bélgica (44), Islas Británicas (23), Francia (21), Holanda (17), Alemania (3) y Suiza (2) (Tellería et al, 1999).

En Albacete, esta especie presenta una fenología un tanto compleja, mostrándose como una especie sedentaria y reproductora en la mitad sudoriental (Hellín, Tobarra, Peñas de San Pedro, Bogarra). En toda la provincia, resulta mucho más abundante durante el otoño y el invierno con claro máximo en octubre. Otra especie que muestra filopatria por su lugar de invernada, regresando a los mismos lugares invierno tras invierno (datos propios).