


El Charcón del Encinar (5), Laguna de Pétrola (3), Laguna de Tinajeros (1) y Puente Torres II (1), presentándose en todos los casos en carrizales o herbazales más o menos densos (datos propios).

Durante este trabajo, se capturó 3 veces: periodos 5 (1) y 8 (2) tratándose de dos individuos jóvenes y un adulto (periodo 8).



**Figura 29.** Capturas de Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*): Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría para esta especie fue la siguiente: **Ala** = 64-67mm, media 65 (n=3); **Tarso** = 19.2-19.6 mm, media 19.4 (n=3); **Peso** = 14.5-22 grms, media 18.5 (n=3).

Los altos niveles de grasa encontrados en estos 3 individuos (4, 6 y 7), avalan la condición de migrante transahariano para esta especie.

**Buscarla Unicolor** (*Locustella luscinioides*): Familia *Sylviidae*, orden *Passeriformes*. Se trata de un ave poco abundante y muy repartida, que cría de manera escasa a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas (preferentemente en la mitad meridional de la Península Ibérica), allí donde encuentra carrizales u otro tipo de vegetación perilagunar. Penetra en Portugal y por el valle del Ebro llega a alcanzar Navarra. También se ha citado en la Meseta sur y en Granada, además existen datos de posible reproducción en Mallorca, Menorca e Ibiza (Cantos, 1992; Tellería et al. 1999).

Migrante transahariano, que al parecer inverna en África tropical y de cuyos movimientos migratorios se conoce muy poco. Llega a la Península a finales de marzo y la abandona a lo largo de agosto, septiem-