

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*): Familia *Sylviidae*, orden *Passeriformes*. Es una especie escasa, que en España cría en algunas lagunas de la costa cantábrica y en marismas andaluzas, además a lo largo del mes de mayo, se han capturado hembras con placa incubatriz en Mallorca y se ha observado la especie en las vegas del Guadiana. No se reproduce en Portugal (Cantos, 1992; De la Puente, 1996; Tellería et al, 1999).

De condición migratoria transahariana, inverna en África tropical y ecuatorial, alcanzando el sudoeste de África desde el este de Senegal a Etiopía, sur y este de Sudáfrica y norte de Namibia. La migración postnupcial por la Península tiene lugar entre finales de julio y noviembre y al parecer transcurre mayoritariamente por la mitad occidental de Iberia e implica fundamentalmente a poblaciones procedentes de las Islas Británicas (40 recuperaciones de aves anilladas allí), Holanda (3), Francia (2) y Noruega (1). Así mismo, 3 aves anilladas en la Península se recuperaron en las Islas Británicas, 1 en Francia y 1 en Noruega (Cantos, 1992; Tellería et al, 1999).

Para la provincia de Albacete, totalizamos tan solo 12 capturas entre 1994 y 1999, que se sitúan plenamente durante los pasos migratorios, 7 en el prenupcial (abril) y 5 en el postnupcial (3 en agosto y 2 en septiembre). Los lugares concretos en los que se realizaron estas capturas fueron: Base Aérea de Los Llanos (1), Charcón del Encinar (2), Laguna Cenagosa (4), Laguna de Los Patos (1), Laguna de Pétrola (1), Laguna de Tinajeros (2) y Puente Torres (1) (datos propios).

Durante nuestro estudio, obtuvimos 2 capturas (periodos 1 y 4), tratándose de un joven (edad 3) y un adulto (edad 4), ambos de sexo indeterminado. Lo temprano de estas capturas podría indicar que el paso postnupcial por este paraje comienza antes del mes de agosto.




Figura 31. Capturas de Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*): Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.