

Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*): Familia *Sylviidae*, orden *Passeriformes*. Se distribuye durante la época reproductora por toda la Península, rarificándose en las áreas montañosas y hacia el norte. Ocupa zonas semiabiertas con árboles dispersos, claros y bordes de bosques, siempre que haya matorrales. En los sotos fluviales resulta especialmente abundante (Cantos, 1992; Tellería et al, 1999).

Se trata de un migrador transahariano que inverna en las zonas más forestales de una estrecha franja comprendida entre Gambia y Nigeria. Permanece en las zonas de cría desde mayo hasta agosto, aunque se pueden encontrar individuos en migración hasta octubre. Por tratarse de un migrante nocturno y poco detectable, su migración es poco conocida. La Península parece ser la vía de paso de las poblaciones de Europa occidental (principalmente francesas). Existen citas invernales en Extremadura, Asturias y Cataluña (Cantos, 1992; Tellería et al, 1999). También esta sobradamente comprobada su marcada filopatria por el lugar elegido para reproducirse (Cantos, 1992 y observaciones propias).

Las más de 500 fichas de capturas de que disponemos para Albacete se distribuyen desde finales de abril hasta primeros de octubre, con máximos en mayo y junio. En nuestra provincia está bien distribuido, pudiendo encontrarse casi en cualquier paraje arbolado o arbustivo, aunque resulta mucho más abundante en sotos fluviales con abundancia de Zarzas (*Rubus ulmifolium*) y Rosales silvestres (*Rosa canina*) (datos propios).

Durante este estudio se lograron 28 capturas (2 de ellas recapturas), tratándose en todos los casos de aves jóvenes del año. El mayor número de capturas al principio del estudio (agosto), parece indicar que este zarcero comienza su migración postnupcial por el lugar con anterioridad al mes de agosto.