


**Alcaudón Común** (*Lanius senator*): Familia *Laniidae*, orden *Passeriformes*. En la Península presenta una distribución típicamente mediterránea, con algunas contadas poblaciones acantonadas en sectores costeros y térmicos de la región Eurosiberiana. Se trata de un típico habitante de los bosques mediterráneos con abundantes claros, así como de sotos fluviales y cultivos arbóreos mediterráneos (olivares, almendrales, etc.) (Tellería et al, 1999).

Otro migrador transahariano que deja la Península entre julio y septiembre, con alguna cita invernal en el piso termomediterráneo (Tellería et al, 1999).

En la provincia de Albacete hemos capturado esta especie para anillamiento en 127 ocasiones entre mediados de abril (primera captura el 7-abril) y finales de septiembre (última captura el 29-9), con máximos de abundancia al abandonar los jóvenes sus nidos (julio y agosto) (datos propios).

A lo largo de este estudio se efectuaron 4 capturas y un control, que en todos los casos fueron aves jóvenes del año y sexo indeterminado.



**Figura 43.** Capturas de Alcaudón Común (*Lanius senator*):

Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Los Alcaudones Comunes anillados presentaron las medidas siguientes: **Ala** = 93-96.5 mm, media 94.62 (n=4). **Tarso** = 22.1-23.2 mm, media 22.65 (n=4), **Peso** = 25-34.5 grms, media 30.62 (n=4) y **Grasa** = 0-3, media 1.75 (n=4).

La fenología observada en las capturas efectuadas durante este trabajo, parece indicar que el paso postnupcial de esta especie por la zona de estudio, comienza antes del mes de agosto.