

**Triguero** (*Miliaria calandra*): Familia *Emberizidae*, orden *Passeriformes*. Un pájaro común y extendido en medios abiertos de la Península Ibérica y Baleares, tendiendo a rarificarse en áreas de montaña. Alcanza las máximas densidades en zonas deforestadas cubiertas por cultivos de cereales, aunque también cría en pastizales, campiñas, dehesas cultivadas y olivares (Tellería y et al. 1999).

En los sectores más fríos o norteños, parece comportarse como un visitante estival, aunque en los pisos más térmicos, presenta patrones de distribución estacional menos claros, probablemente debido a la existencia de movimientos generalizados a lo largo de la Península. Se han obtenido recuperaciones que implican movimientos más o menos importantes, algunas incluso procedentes de otros países como Francia, Bélgica y Alemania y se han recuperado aves en el norte de África marcadas en España, lo que indica cierto paso por el Estrecho. Durante el invierno, su abundancia parece disminuir en términos generales, notándose además una sensible reducción en cultivos extensivos de cereales (Tellería et al. 1999).

En Albacete es un pájaro común en espacios abiertos a lo largo de todo el año, no observándose descenso poblacional durante el invierno como comentan Tellería y colaboradores para la Península en general. Al contrario, el mayor número de anillamientos efectuados en Albacete se producen entre noviembre y febrero, justo cuando se agrupa formando dormideros más o menos importantes en lugares con vegetación palustre, lo que facilita su captura. Todos los controles efectuados han sido locales, sin implicar movimiento alguno, si muestra cierta filopatría al lugar elegido como dormidero otoño-invernal (datos propios).

La única captura se consiguió en el periodo 11, tratándose de un macho de edad indeterminada.



**Figura 48.** Capturas de Triguero (*Miliaria calandra*);

Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo;