

Alcaraz (Bienservida, Villapalacios, Sierra del Relumbrar, Alcaraz) (**Figura 31**).

Notas: Las características que lo diferencian de las restantes especies de *Cheilanthes* son la presencia de pelos glandulares densos en las pínulas y la posesión de un pecíolo, al menos, dos veces mayor que la lámina.

***Cheilanthes maderensis* Lowe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 6: 528 (1838)**

Cheilanthes petridioides (Reichard) C. Chr., Index Filic. : 178 (1905)
nom. rej. prop.

Cheilanthes fragans (L. fil.) Swartz, Syn. Filic.: 127, 325 (1806)

Polypodium pteridioides Reichard, Syst. Pl. 4: 424 (1870)

Cheilanthes odora auct., non Swartz

Familia: PTERIDACEAE

Descripción (Figura 34): Rizoma: corto, cubierto de páleas lineares pardo-rojizas. Fronde: de 5 a 16 cm, amacolladas. Pecíolo: pardo, con páleas castaño pálidas en toda su longitud. Lámina: oval-lanceolada a oblongo-lanceolada. Bipinnatisecta. De longitud similar al pecíolo. Pínulas: ovales, festoneadas de forma profunda e irregular, glabras. Venas: libres. Soros: marginales, con pseudoindusio discontinuo, estrecho y lobulado, con margen entero o denticulado, ferrugíneo en el borde. Esporas: subesféricas, de 41 a 48 µm, con perisporio crestado. Esporulación: de enero a julio.

Ecología y biotipo: Se presenta en taludes y roquedos silíceos, tanto en exposiciones sombrías como soleadas. 100-700 m. Hemicriptófito.

Corología: Regiones Mediterránea occidental y Macaronésica, presente en buena parte de la geografía peninsular. En la provincia se encuentra en zonas de las sierras occidentales y en la Sierra de las Cabras (Hellín) (**Figura 33**).

Notas: Este *Cheilanthes* presenta el borde del pseudoindusio con margen entero o denticulado, característica que lo diferencia del resto de especies del mismo género.

***Cheilanthes tinaei* Tod., in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217-218. (1866)**

Cheilanthes odora auct., non Swartz

Cheilanthes pteridioides auct., non (Reichard) C. Chr.

Cheilanthes fragans auct., non (L. fil.) Swartz