

Cuadro VIII. Las roturaciones en Sax.

| <u>Superficie roturada</u> | <u>% propietarios</u> | <u>% Superficie roturada</u> |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| < 1 f | 57,8 | 23,9 |
| de 1 f a 4,9 f | 41,0 | 68,8 |
| ≥ 5 f | 1,2 | 7,2 |

Fuente: A.C.M., Leg. G. 166.

Cuadro IX. Las roturaciones en Albacete (partidos de Albacete y de El Salobral de la dezmería de Chinchilla).

| <u>Superficie roturada</u> | <u>% propietarios</u> | <u>% Superficie roturada</u> |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| < 25 f | 48 | 9,6 |
| de 25 f a 49 f | 24 | 24,9 |
| ≥ 50 f | 28 | 65,4 |

Fuente: A.C.M., Leg. G. 166.

Cuadro X. Categoría de tierras roturadas en El Salobral.

| <u>Categoría</u> | <u>Superficie (almudes)</u> | <u>%</u> |
|------------------|---------------------------------|----------|
| 1.ª | 104 | 12,7 |
| 2.ª | 278 | 34,0 |
| 3.ª | 436 | 53,3 |

Fuente: A.G.M., Leg. G. 166.