

- alta, de coloraciones rosadas en la parte media con retículo concoloro. Aparece en suelos calizos bajo encinas, muy raro. Especie muy rara en la provincia, Sierra de Alcaraz..... *Suillellus pulchrotinctus*
- 10a** Cutícula con coloraciones rojas o rosadas.....11
- 10b** Cutícula sin coloraciones rojas o rosadas12
- 11a** Cutícula de color rojo vivo, rojo sangre. Pie de colores anaranjados excepto en la parte baja que es amarillo, con retículo fino de color rojo vivo en todo el pie. Bajo frondosas en suelos ácidos, raro.....
..... *Suillellus permagnificus*
- 11b** Cutícula marrón sucio con el margen rosado. Retículo amplio y muy marcado. Se mancha de azul intenso al roce. A menudo, con olor característico, como de fruta fermentada o compota de manzanas. Poco común, en la Sierra de Alcaraz, bajo encinas, en suelos calizos*Suillellus poikilochromus*
- 11c** Cutícula en principio de colores amarillentos, pronto de colores rosados o rojizos que se mantiene en zonas rozadas, finalmente ocrácea. Pie de color amarillo anaranjado en la parte de arriba, de color rojo vivo de la mitad hacia abajo, retículo de color rojo. Carne encima del himenio de color amarillo. Bajo frondosas en terreno ácido, raro*Imperator luteocupreus*
- 12a** Cutícula de colores ocráceos, a veces con tonalidades naranjas. Pie amarillo en la zona superior, rojo vivo en la base, retículo en todo el pie. La carne encima del himenio es de color rojo. Indiferente en cuanto a la naturaleza del terreno, se asocia tanto a coníferas como a frondosas, abundante si las condiciones son adecuadas.....
..... *Suillellus luridus*
- 12b** Como *Suillellus luridus* pero la carne que hay encima del himenio es de color amarillo. En la provincia se ha encontrado bajo encinas
.....*Suillellus caucasicus*