

- 12c** Como *Suilellus luridus* pero con la diferencia de que el retículo no aparece en la parte inferior de pie, solo en la superior, estando la inferior adornada con punteaduras de color rojo. Esta es una especie de reciente descripción que ha sido localizada en la sierra de Alcaraz bajo encinas..... *Suilellus mendax*
- 13a** Pie de color amarillo con punteaduras de color rojo. Cutícula de color marrón a pardo con tonalidades rojizas. Poros de color rojo vivo. Aparece bajo frondosas o coníferas en terreno ácido. En la provincia es poco común*Neoboletus erythropus*
- 13b** Pie sin ninguna ornamentación o con ligero retículo en la unión del pie con el himenio..... 14
- 14a** Cutícula mate, seca, algo aterciopelada..... 15
- 14b** Cutícula algo lubricada, sobre todo en tiempo húmedo, con tonalidades rosadas más o menos fuertes..... 16
- 15a** Cutícula de color marrón, ocre, pero siempre con tonalidades anaranjadas. Himenio de color naranja. Pie liso de color amarillo con tonalidades rojizas o anaranjadas. Carne amarilla que al corte vira al azul intensamente y la base del pie toma coloraciones rojizas. Bajo frondosas, indiferente en cuanto a la naturaleza del suelo, aunque más abundante en terreno ácido *Suilellus queletii*
- 15b** Cutícula de color pardo rojizo, pardo oscura. Pie de tonos más claros que el tipo. Resto de caracteres como el tipo. En Albacete es más frecuente.....*Suilellus queletii var. lateritius*
- 16a** Pie con restos de retículo en la inserción del himenio con el pie, muy radicante. Cutícula de color ocre que va tomando coloraciones rojizas desde el centro hacia el borde del sombrero con la edad. Himenio de color naranja o rojo sangre desde el principio. Bajo frondosas en suelo arenoso, poco frecuente en la provincia.....
.....*Suilellus comptus*