

La primera cita de Malvasía Cabeciblanca en Albacete corresponde a un macho abatido durante una cacería en la Laguna de Pétrola, en el otoño de 1988 (M. Bonilla, com.pers).

No obstante, la especie comenzó a verse de forma regular en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, a partir de septiembre de 1997 con observaciones en la citada Laguna de Pétrola (Sociedad Albacetense de Ornitología, 2001).

Entre los años 1997 y 2000 (4 años), estuvo presente simultáneamente hasta en 8 localidades (año 1998; Figura 5) y se reprodujo en 6-7 (en 3-5 simultáneamente; Figura 6). Su abundancia media fue de 54,7 aves/censo. El máximo poblacional de 236 aves en julio de 2000 (Figura 7), sería relevante si consideramos que el máximo anual en Castilla-La Mancha estuvo cerca de los 500 individuos (Torres-Esquivias, 2003c).




Figura 5. Número de humedales con aves de manera simultánea, en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera. Censos mensuales, del periodo 1998-2013.

Lo dicho para este periodo denotaría una ocupación rápida de determinados humedales más favorables del Complejo lagunar (básicamente Salobrejo, Pétrola y Ontalafia). Esto parece ser consecuencia del aumento progresivo de la población ibérica experimentado a partir del año 1995 y con máximo histórico en el 2000 (Torres-Esquivias, 2008).

Por otra parte, los adecuados niveles de inundación en los humedales ibéricos permitieron que la especie ampliase de forma significativa el número