

*Pseudoophonus (Pseudoophonus) griseus* (Panzer, 1797)

Elemento paleártico. Especie higrófilo, lapidícola; atraída a la luz de junio a septiembre. Saladar de Cordovilla.

*Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes* (Degeer, 1774)

Elemento paleártico. Especie higrófila; abril a octubre. Embalse de Taibilla. Lagunas de Horna. Pétrola. Ruidera. Saladar y Salobralejo. Saladar de Cordovilla.

Subtribu Stenolophina

*Acupalpus (Acupalpus) brunnipes* (Sturm, 1825)

Elemento mediterráneo occidental. Especie paludícola; abril a julio. Laguna de Pétrola. Saladar de Cordovilla. Salinas de Pinilla.

*Acupalpus dubius* Schilsky, 1888

Elemento europeo. Especie higrófila. Lagunas de Ruidera.

*Acupalpus elegans* Dejean, 1829

Elemento mediterráneo. Especie halobia; enero a marzo. Lagunas de Hoya Rasa. Mojón Blanco. Pétrola. Saladar y Salobralejo. Saladar de Cordovilla.

*Acupalpus (Acupalpus) maculatus* (Schaum, 1860)

Elemento mediterráneo. Especie halófila, paludícola; abril a julio. Lagunas de Pétrola. Ruidera y Saladar. Saladar de Cordovilla. Salinas de Pinilla.

*Acupalpus notatus* Mulsant et Rey, 1871

Elemento mediterráneo. Especie halófila, ripícola; abril a julio. Embalse de Fuensanta. Lagunas de Pétrola y Saladar, Saladar de Cordovilla.

*Bradycellus distinctus* (Dejean, 1828)

Elemento atalanto mediterráneo macaronésico. Especie higrófila; noviembre. Lagunas de Pétrola y Saladar. Saladar de Cordovilla.

*Bradycellus harpalinus* (Audinet-Serville, 1821)

Elemento europeo. Especie higrófila. Lagunas de Corralrubio y Pétrola.