

Subtribu Apenina

Platytarus famini Dejean, 1826

Elemento mediterráneo. Especie higrófila; marzo a junio. Embalse de Camarillas, Saladar de Cordovilla.

Subtribu Lebiina

Lebia (Lamprias) cyanocephala (Linnaeus, 1758)

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola; marzo a julio. Embalse de Talave, Saladar de Cordovilla.

Lebia (Lebia) cruxminor cruxminor (Linnaeus, 1758)

Elemento paleártico occidental. Especie paludícola; junio. Embalse de Taibilla.

Lebia (Lebia) trimaculata (Villers, 1789)

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola; marzo, abril y mayo. Embalse de Taibilla, Saladar de Cordovilla.

Subtribu Demetriadina

Demetrias (Demetrias) atricapillus (Linnaeus, 1758)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila; marzo. Saladar de Cordovilla.

Subtribu Dromiina

Mesolestes scapularis (Dejean, 1829)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola, bajo las cepas de los juncos y atraída a la luz; mayo a noviembre. Saladar de Cordovilla.

Microleste abeillei abeillei (Brisout de Barneville, 1885)

Elemento mediterráneo occidental macaronésico. Especie lapidícola; lugares secos, sobre todo en barbecho y atraída a la luz de abril a agosto. Embalse de Talave, Saladar de Cordovilla.