

Syntomus fuscomaculatus (Motschoulsky, 1844)

Elemento mediterráneo. Especie xerófila y lapidícola; todo el año. Embalses de Fuensanta y Talave, Lagunas de Pétrola, Ruidera y Saladar, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Dryptini**

Drypta dentata (Rossi, 1790)

Elemento cosmopolita. Especie higrófila, paludícola; marzo y noviembre. Saladar de Cordovilla.

Tribu **Zuphiini**

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila y paludícola; marzo a agosto y en noviembre. Embalses de Camarillas y Fuensanta. Lagunas de Horna, Pétrola, Ruidera, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Zuphium olens olens (Rossi, 1790)

Elemento paleártico templado. Especie higrófila y paludícola; marzo a julio. Embalse de Camarillas, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Brachinini**

Aptinus displosor (Dufour, 1811)

Elemento ibérico. Especie lapidícola; marzo a junio. Embalses de Camarillas y Talave.

Brachinus (Brachinus) crepitans (Linnaeus, 1758)

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola y paludícola; marzo a junio. Embalse de Taibilla.

Brachinus (Brachinus) plagiatus Reiche, 1868

Elemento mediterráneo. Especie higrófila; enero a junio y noviembre. Embalse de Camarillas, Lagunas de Pétrola, Saladar y Salobralejo Saladar de Cordovilla.

Brachinus (Brachynidius) explodens (Duftschmid, 1812)

Elemento europeo. Especie higrófila y lapidícola; mayo. Salinas de Pinilla.