

Recueja.- 7♂♂, 7♀♀, 27-VIII-90; 2♂♂, 3♀♀, 24-IX-90.

Esta especie ha sido localizada en una estación de muestreo situada en los márgenes del río Júcar, a 540 m. de altitud, durante los meses de Agosto y Septiembre, con máximo poblacional para ambos sexos en el primer mes del ciclo. El tipo fisiológico de vegetación de la localidad es el pastizal no agostante alto. Los individuos han sido capturados entre las gramíneas que crecen en la base de juncos (*Scirpus holoschoenus*) y espadaña (*Typha latifolia*). Se distribuye por toda la Península, exceptuando la zona centro, Europa Central y Meridional, Francia, Italia, norte de Africa y oeste de Asia. Se trata de un elemento mediterráneo.

DECTICINAE

Platycleis (Platycleis) albopunctata subsp. *hispanica* Zeuner, 1941

MATERIAL ESTUDIADO

Corral.- 1♂, 28-VI-90. **C.Tiro.**- 2♀♀, 28-VI-90. **Plaga.**- 1♀, 28-VI-90. **Puerto.**- 1♀, 25-IX-90. **Carcelén.**- 1♂, 28-VI-90. **Torró Pra.**- 1♀, 27-VII-90. **Sotón.**- 1♀, 27-VI-90. **Cruz.**- 1♀, 28-VIII-90. **Delgado.**- 2♂♂, 1♀, 27-VI-90; 1♂, 26-IX-90. **Puerto.**- 1♀, 28-VI-90. **La Cabeza.**- 1♀, 28-VI-90. **Pico Muqrón.**- 2♂♂, 1♀, 28-VII-90; 1♂, 2♀♀, 25-VIII-90; 1♂, 1♀ 26-IX-90.

Altitudinalmente ocupa las cotas medio-altas de la zona de estudio (700 - 1200 m.). Presenta una generación anual de Junio a Septiembre, con máximo poblacional para ambos sexos en el primer mes del ciclo. Especie característica de la rala vegetación herbácea que rodea a los matorrales de porte variable. Se distribuye por el suroeste de Francia, norte de Marruecos y la práctica totalidad de la Península Ibérica. Se trata de un elemento mediterráneo occidental.

Platycleis (Platycleis) albopunctata subsp. *sculpta* Zeuner, 1941

MATERIAL ESTUDIADO

Jima.- 1♂, 1♀, 28-VI-90. **Cabras.**- 1♂, 28-VI-90. **Sotón.**- 1♂, 2♀♀, 27-VI-90. **Puntal de Meca.**- 1♂, 29-VI-90. **Cuerda del Muqrón.**- 1♂, 25-VIII-90; 1♀, 26-IX-90.

Ocupa el rango altitudinal comprendido entre los 900 m. y 1100 m. Se le encuentra en estado adulto desde Junio a Septiembre, con máximo poblacional en el primer mes del ciclo. El tipo fisiológico de vegetación preferido es el matorral aclarado con abundante *Stipa capillata*. Se distribuye por las provincias de Guadalajara y Madrid (**Pinedo**, 1982), Albacete (**Gómez & Pardo**, 1991), Ciudad Real y Cuenca (**Pardo** et al, in litt). Se trata de un endemismo español.