

Platycleis (Tessellana) tessellata (Charpentier, 1825)

MATERIAL ESTUDIADO

Corral.- 1♀, 28-VI-90. **C.Tiro.**- 1♀, 28-VI-90. **Puerto.**- 1♀, 28-VI-90. **Torró Pra.**- 1♂, 27-VII-90; 2♂♂, 1♀, 28-VIII-90. **Solana.**- 1♂, 27-VI-90; 1♂, 27-VII-90. **Aparicio.**- 4♂♂, 27-VII-90; 3♂♂, 3♀♀, 28-VIII-90; 2♂♂, 1♀, 26-IX-90. **Delgado.**- 4♀♀, 27-VI-90; 1♂, 1♀, 26-IX-90. **Morón.**- 2♂♂, 4♀♀, 29-VI-90; 3♂♂, 2♀♀, 28-VII-90.

Su distribución altitudinal se extiende desde los 830 m. a los 1030 m. Presenta una generación de Junio a Septiembre, con máximo poblacional para machos y hembras en los meses de Julio y Junio, respectivamente. Se le ha localizado, generalmente, en pastizales agostantes bajos de gramíneas (*Poa* sp., *Bromus* sp., *Hordeum*, sp., etc) o sobre éstas cuando aparecen rodeando a otros pastizales más higrófilos. Se distribuye por el sur de Europa, norte de África, sur de Rusia y Asia Menor. Citada en la mayoría de las provincias peninsulares españolas y Canarias. Introducida accidentalmente en California (Defaut, 1988). Se trata de un elemento mediterráneo-turánico-macaronésico.

Thyreonotus corsicus subsp. *corsicus* (Rambur, 1839)

MATERIAL ESTUDIADO

Aparicio.- 1♀, 26-IX-90. **Rincón de Zapata.**- 1♀n, 29-VI-90. **Pico Mugrón.**- 1♂, 25-VIII-90; 1♀, 26-IX-90.

Ocupa las cotas más elevadas de la sierra, por encima de los 990 m.. Su fenología abarca los meses de Agosto y Septiembre, apareciendo las primeras ninfas en el mes de Junio. Manifiesta una marcada preferencia por el matorral bajo de lentisco (*Pistacia lentisco*) y coscoja (*Quercus coccifera*). Se distribuye por Francia, isla de Córcega, Marruecos y la totalidad de la Península Ibérica. Se trata de un elemento mediterráneo occidental.

EPHIPPIGERINAE

Steropleurus perezii (Bolívar, 1877)

MATERIAL ESTUDIADO

Puerto.- 1♀, 26-VII-90. **Rincón de Zapata.**- 1♂, 3♀♀, 29-VI-90. **Cuerda del Mugrón.**- 1♀, 29-VI-90; 1♂, 25-VIII-90; 1♂, 1♀, 26-IX-90. **Pico Mugrón.**- 2♂♂, 1♀, 26-IX-90.

Altitudinalmente se distribuye entre los 880 m. y los 1200 m. Presenta una generación anual de Junio a Septiembre. Manifiesta marcada preferencia por el tipo fisionómico de vegetación matorral bajo denso que conforma la encina rastrera (*Quercus rotundifolia*), *Quercus coccifera*, *Genista* sp., y *Erinacea anthyllis*. Citado de las provincias de Barcelona,