

26-IX-90. **Cruz.**- 2♀n, 28-VIII-90. **Morón.**- 1♂, 1♀, 17-V-90. **Puntal de Meca.**-1♀, 17-V-90.

Ocupa todas las cotas de la sierra por debajo de los 1000 m. de altitud. Los adultos aparecen de Mayo a Noviembre, encontrándose ninfas en los meses de Agosto y Septiembre. Manifiesta preferencia por los pastizales, tanto agostantes como no agostantes, cercanos a zonas de cultivo. En la Península Ibérica ha sido citada, hasta ahora, de Albacete (**Gómez & Pardo**, 1991), Ciudad Real (**Gómez & Pardo**, in litt.), Jaén, Madrid, Navarra, Santander, Sevilla, Teruel y Valencia (**Herrera**, 1982), Alava (**Herrera**, 1985), Guipúzcoa, Vizcaya (**Burgos & Herrera**, 1986), Granada (**Arcos & Pascual**, 1988), Cuenca, Guadalajara (**Pardo et al.**, in litt.). También se distribuye por Asia Menor y Central, norte de Africa y Europa, incluyendo Gran Bretaña. Se trata de un elemento paleártico.

*Gryllus bimaculatus* De Geer, 1773

#### MATERIAL ESTUDIADO

**Recueja.**- 1♂, 27-VIII-90. **Medrila.**- 1♀, 21-V-90; 2♂♂, 28-VI-90. **Torró Pra.**- 1♀n, 25-IX-90. **Delgado.**- 1♀n, 28-VIII-90. **Guarda.**- 1♀n, 28-VIII-90. **Morón.**- 1♀, 26-IX-90.

Su presencia se limita a pastizales situados en las inmediaciones de cursos de agua, o capaces de retener altas concentraciones de humedad. Altitudinalmente ocupa las cotas medio-bajas de la zona de estudio, por debajo de los 960 m. Los adultos fueron capturados de Mayo a Septiembre, apareciendo las ninfas en los dos últimos meses del ciclo. Se distribuye por la mayor parte de la Península ibérica, llegando hasta la meseta central (**Llorente**, 1978), Europa mediterránea, Asia Occidental y Central y norte de Africa. Es un elemento mediterráneo-turánico.

*Acheta hispanica* Rambur, 1839

#### MATERIAL ESTUDIADO

**Morón.**- 1♀, 17-V-90.

El único ejemplar capturado se encontraba bajo piedras, en una estación de muestreo situada a 830 m. de altitud y cuyo tipo fisionómico de vegetación es el pastizal agostante bajo de *Salvia lavandulifolia*, *Diplotaxis erucoides*, *Bromus tectorum*, etc.. Se distribuye por el norte de Africa, Iran y Madeira. Dentro de la Península ha sido citada de Albacete (**Gómez & Pardo**, 1991), Alicante, Canarias, Granada, Málaga, Murcia (**Herrera**, 1982) y Cuenca (**Pardo et al.**, in litt). Elemento mediterráneo-macaronésico.

#### OECANTHINAE

*Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763)