

Cuadro 5

Número de especies y proporciones de los distintos tipos de elementos biogeográficos que presenta la fauna de Carabidae en enclaves húmedos de la provincia de Albacete.

Localidad	Tipo de categoría biogeográfica						n° espec.
	Amplia distribuc.	Europeos	Eurosibe.	Mediterr.	Ibéricos	Orófilos	
Almansa	7 (29,2%)	1 (4,2%)	2 (8,3%)	12 (50%)	2 (8,3%)	-	24
Arquillo	7 (33,3%)	2 (9,5%)	2 (9,5%)	8 (38,1%)	2 (9,5%)	-	21
Camariillas	12 (34,3%)	1 (2,9%)	3 (8,6%)	16 (45,7%)	3 (8,6%)	-	35
Cordovilla	31 (29,2%)	5 (4,7%)	6 (5,7%)	56 (52,8%)	6 (5,7%)	2 (1,9%)	106
Corralrubio	4 (18,2%)	3 (13,6%)	1 (4,5%)	11 (50%)	2 (9,1%)	1 (4,5%)	22
Fuensanta	9 (23,7%)	3 (7,9%)	1 (2,6%)	21 (55,3%)	4 (10,5%)	-	38
Horna	10 (30,3%)	1 (3%)	2 (6,1%)	18 (54,5%)	2 (6,1%)	-	33
Ontalafia	7 (43,8%)	1 (6,3%)	1 (6,3%)	6 (37,5%)	1 (6,3%)	-	16
Pétrola	22 (24,7%)	5 (5,6%)	6 (6,7%)	50 (56,2%)	6 (6,7%)	-	89
Pinilla	7 (18,4%)	2 (5,3%)	3 (7,9%)	24 (63,2%)	2 (5,3%)	-	38
Ruidera	24 (34,8%)	6 (8,7%)	7 (10,1%)	26 (37,7%)	6 (8,7%)	-	69
Saladar	14 (24,6%)	5 (8,8%)	6 (10,5%)	31 (54,4%)	1 (1,8%)	-	57
Salobralejo	15 (27,3%)	2 (3,6%)	6 (10,9%)	29 (52,7%)	3 (5,5%)	-	55
Taibilla	18 (28,1%)	3 (4,7%)	3 (4,7%)	30 (46,9%)	6 (9,4%)	4 (6,3%)	64
Talave	13 (27,7%)	4 (8,5%)	2 (4,3%)	21 (44,7%)	4 (8,5%)	3 (6,4%)	47
Víllora	8 (33,3%)	-	2 (8,3%)	12 (50%)	2 (8,3%)	-	24