

MATERIAL ESTUDIADO

Torró Pra.- 1♂, 25-IX-90. **Solana.**- 1♀, 28-VIII-90. **Morón.**- 1♂, 29-VI-90; 1♂, 1♀, 28-VII-90; 1♂, 1♀, 26-IX-90.

Altitudinalmente ocupa las cotas comprendidas entre los 830 m. y los 1030 m. Presenta una generación anual de Junio a Septiembre. El tipo fisionómico de vegetación preferido es el pastizal agostante bajo. Los individuos han sido capturados sobre gramíneas (*Aegylops geniculata*, *Bromus tectorum*, *Hordeum* sp., *Poa* sp. ..). Se distribuye por la práctica totalidad de la Península Ibérica, Canarias, Mallorca, Menorca, Sicilia, resto de Europa meridional, Madeira, Asia Menor y Central y norte de Africa. Elemento mediterráneo-turánico-macaronésico.

GRYLLOTALPIDAE

GRYLLOTALPINAE

Gryllotalpa gryllotalpa (Linneo, 1758)

MATERIAL ESTUDIADO

Recueja.- 2♂♂, 1♀, 29-VII-90; 1♂, 1♀, 1♀n, 27-VIII-90.

Capturada en una estación de muestreo situada a 540 m. de altitud, en los márgenes del río Jucar, cercana a terrenos con cultivos hortícolas. Su fenología abarca los meses de Julio y Agosto. Los individuos permanecen la mayor parte del tiempo ocultos en las galerías que ellos mismos construyen. Se distribuye por toda la Península Ibérica, Mallorca, Menorca, Europa Central y Meridional, Gran Bretaña, Sicilia, Creta, Asia Occidental y norte de Africa. Es un elemento paleártico.

CAELIFERA

TETRIGOIDEA

TETRIGIDAE

Paratettix meridionalis (Rambur, 1838)

MATERIAL ESTUDIADO

Recueja.- 1♂, 1♀, 27-VIII-90; 2♂♂, 24-IX-90; 2♂♂, 22-X-90. **Carcelén.**- 1♂, 25-IX-90. **Torró cul.**- 1♂, 1♀, 18-V-90; 8♂♂, 5♀♀, 28-VI-90, 6♂♂, 5♀♀, 27-VII-90; 3♂♂, 2♀♀, 28-VIII-90; 4♂♂, 3♀♀, 25-IX-90; 6♂♂, 6♀♀, 23-X-90; 5♂♂, 4♀♀, 13-XI-90; 5♂♂, 4♀♀, 20-XII-90; 1♂, 4♀♀, 17-I-90. **Aparicio.**- 1♂, 3♀♀, 17-V-90.