

MATERIAL ESTUDIADO

Hoya.- 1♀n, 23-X-90; 1♂n, 13-XI-90; 2♂, 27-VI-90.

Ha sido capturada en una localidad situada a 970 m. de altitud. Los ejemplares adultos han sido recolectados en el mes de Junio, apareciendo ninfas en los meses de Octubre y Noviembre, lo que parece indicar que la especie pasa el invierno en dicho estado. El tipo fisionómico de vegetación de la localidad es el pastizal agostante de *Avenula bromoides* y *Bromus rubens* con matorral de *Genista* sp. y *Thymus* sp., localizándose los individuos adultos en las zonas más aclaradas de vegetación. En la Península Ibérica se encuentra por el este, centro y sur; en Portugal llega hasta el centro. Se distribuye por el sur de Europa, islas del Mediterráneo, norte de Africa, Palestina e islas Canarias. Es un elemento mediterráneo-macaronésico.

OEDIPODINAE

Locusta migratoria subsp. *cinerascens* (Fabricius, 1781)

MATERIAL ESTUDIADO

Recueja.- 1♂, 27-VIII-90; 1♀, 24-IX-90.

Su presencia está limitada a una sola localidad de la zona de estudio, situada a 540 m. de altitud, durante los meses de Agosto y Septiembre. El tipo fisionómico de vegetación de la estación es el pastizal no agostante alto de *Scirpus holoschoenus*, *Typha latifolia* y *Phragmites* sp.. Se distribuye por toda la Península además de las islas de Mallorca y Menorca. Se extiende a lo largo de los países del sur de Europa bañados por el Mediterráneo. Es un elemento europeo meridional.

Oedaleus decorus (Germar, 1826)

MATERIAL ESTUDIADO

Corral.- 1♂n, 28-VI-90; 1♂, 1♀, 29-VIII-90. C.Tiro.- 2♂n, 28-VI-90; 2♂♂, 26-VII-90; 2♂♂, 29-VIII-90. Casas.- 1♂, 26-VII-90; 1♀, 25-IX-90. Delgado.- 1♀, 1♂n, 27-VII-90.

Ocupa el rango altitudinal comprendido entre los 800 m. y 1000 m. Presenta una generación anual de Julio a Septiembre, con densidad máxima de individuos de ambos sexos en Agosto. El tipo fisionómico de vegetación preferido es el pastizal agostante bajo, junto con el matorral bajo de cobertura variable. Se extiende por la práctica totalidad de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Citada de todos los sistemas montañosos castellano-manchegos (Pardo et al., in litt). Se distribuye por la mitad sur de Europa, este de Asia, norte de Africa y Madeira. Es un elemento mediterráneo-macaronésico.