

VEGET. La rambla está seca, encontrando en su cauce y márgenes especies usuales en la zona como los tomillos, cervero y aliagas (matorral degradado), mezcladas con otras que indican cierta humedad freática, como son las zarzas, juncos, clemátide, tarayes, chopos, etc.

OBS. Debido a su complicado anclaje en los taludes de la rambla, numerosos pies tienen descalzadas sus raíces. Se observan varios nidos de pico picapinos en los pies secos.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
22.4.94	—	S	A2	varios pies muertos
7.10.94	L	S	B2	se acusa estrés hídrico
15.6.95	L	S	C3	brotos del año muertos, y se aprecia anillo necrótico en su sección

La Tejera. 570.010; 4.270.702; 800 m.

LOC. A unos 2 km. de Bogarra, por el camino hacia Potiche y Vizcaínos, abajo junto al Río de Bogarra.

CARACT. MASA. Es un grupo abierto y lineal, de ámbito muy reducido siguiendo los márgenes del río. En la masa se distinguen dos porciones, una de grandes pies muertos que alcanzan una altura de 10 m y otra de portes más imbricados en espesura, con $h_0 = 4.5$ m.

VEGET. Cualitativamente es muy similar a la del grupo anterior, si bien alcanza gran desarrollo por encontrarse junto al río, mezclándose en sus márgenes con frutales y choperas de cultivo.

OBS. Grupo situado junto al cauce sobre sustrado fértil, con notable aporte de elementos finos, y de cierta inestabilidad.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
22.4.94	—	S	A2	3 grandes pies muertos
2.9.94	L	S	A3	—
15.6.95	—	S	B3	se aprecia claramente el efecto dominó (raíces), infectando aguas abajo.

Cortijo El Salao. 571.143; 4.269.849; 800 m.

LOC. A orillas del Río de Bogarra, a la altura de este cortijo, antes de llegar al cruce con la carretera Potiche-Vizcaínos, transitando por el camino citado en el grupo anterior.

CARACT. MASA. Grupo muy espeso, olmeda pura con gran desarrollo del estrato arbustivo, por el rebrote de raíz.